FIXOR 100SL

Acide alpha naphtylacétique (ANA) (100 g/l)

Présentation du produit

- **Nom Commercial** : FIXOR 100SL
- **Classe du produit** : Eclaircisseur
- **Numéro d'autorisation de vente au Maroc** : F12-3-018
- **Type de formulation** : Concentré Soluble (SL)
- **Composition chimique :** Acide alpha naphtylacétique (ANA) (100 g/l)
- **Mode d'action** : L'ANA agit par voie endothérapique sur la multiplication des cellules et le métabolisme cellulaire. L'ANA présente également une interaction avec les substances de croissance naturelles (modification des équilibres hormonaux à l'intérieur de la plante).
- **Site d'action** : Modification des équilibres hormonaux à l'intérieur de la plante

Efficacité

Culture	Usage	Dose L/hl
Pommier	Contre la chute prématurée des fruits	10 cc/hl
Pommier	Eclaircissage des fruits	10 cc/hl
Poirier	Contre la chute prématurée des fruits	10 cc/hl

Conditions d'emploi

- **Mode d'emploi** : FIXOR 100SL est recommandé pour une application foliaire.

Application pour éclaircissage chimique sur pommier:

L'éclaircissage à base de NAA 100 SL doit être appliqué à des vergers présentant des conditions de pollinisation favorables. Eviter de pratiquer un traitement phytosanitaire de couverture (fongicide, insecticide) juste avant et juste après l'application de NAA 100 SL

Conditions d'application:

Température lors de l'application: entre 15 et 25 °C.

Traiter de préférence le soir.

Eviter les fortes chaleurs

Hygrométrie: 80 à 95 %

Application pour empêcher la chute précoce des fruits de pommier et de poirier :

Il est recommandé d'appliquer le produit pendant l'après-midi d'une chaude journée, sans risque de pluie immédiat.

- **Période d'emploi** :

Application pour éclaircissage chimique sur pommier:

Le maximum d'efficacité est obtenu avec des applications précoces quand les fruits présentent un diamètre entre 8 et 12 mm, ce qui correspond à un délai de 10 à 25 jours après floraison selon les variétés et les conditions locales.

Application pour empêcher la chute précoce des fruits de pommier et de poirier :

Deux applications doivent être réalisées, la première 14 jours avant la récolte et la seconde au plus tard 7 jours avant la récolte.

- **Conditionnement :** 500 ml (12 x 500 ml)